

Lesión tumoral en región glútea

Tumor Lesion of the Gluteal Region

Maryla González Gorrín^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-7034-5264>

¹Hospital Pediátrico Docente San Miguel del Padrón. La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia: maryla@infomed.sld.cu

Recibido: 05/05/2021

Aceptado: 13/06/2021

Caso clínico

¿Cuál es su diagnóstico?

Motivo de consulta: Lesión en piel de región glútea.

Paciente femenina, 59 años de edad, color de piel blanca, con buenos antecedentes patológicos personales, que acude a consulta por presentar “un lunar” en la región glútea izquierda, de varios meses de evolución, el cual nota le ha crecido en los últimos meses. No se acompaña de ninguna sintomatología. Al examen físico cutáneo se constata lesión T de aspecto nodular, de bordes regulares, bien definidos, base sésil, de forma oval, eritematosa, con zonas pigmentadas, superficie lisa, brillante, consistencia blanda, no adherida a

planos profundos, de aproximadamente 4 x 2 cm de diámetro localizada en región glútea izquierda (fig. 1).




Fig. 1 - Lesión T de aspecto nodular, con zonas pigmentadas, en región glútea izquierda.

Se realiza dermatoscopia y se observa patrón vascular polimorfo con áreas rojo-lechosas irregulares, lagunas rojas, vasos lineales irregulares, con nidos ovoides gris-azulados.

Se realizó toma de biopsia escisional (fig. 2).




Fig. 2 - Sección de piel teñida con hematoxilina – eosina 40x.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.