

## Lesiones eritematosas de distribución lineal en un adulto

### Erythematous lesions of linear distribution in an adult

#### Caso clínico

Paciente femenina, de 61 años de edad, color de piel blanca, procedencia rural, con antecedentes de salud aparente, que presenta lesiones en piel de miembro inferior izquierdo, hemiabdomen, genitales y glúteo izquierdo, intensamente pruriginosas, de más de 15 años de evolución. Nunca había consultado a un médico, y se había automedicado por mucho tiempo con diferentes cremas esteroideas, antibióticas e hidratantes. Acude espontáneamente al Servicio de Dermatología de nuestro hospital por la persistencia de las lesiones y el intenso prurito.

Al examen dermatológico presenta lesiones eritematoescamosas e hiperqueratósicas con un recorrido lineal o zosteriforme, que se extienden por todo el miembro inferior izquierdo, glúteo, hemiabdomen izquierdo, y genitales de ese mismo lado (Figs. 1, 2 y 3).



**Fig. 1** - Lesiones eritematoescamosas que se extienden por todo el miembro inferior izquierdo.



**Fig. 2** - Lesiones que se extienden al hemiabdomen izquierdo.




**Fig. 3** - Lesiones que toman genitales externos.

Se le realizan exámenes de laboratorio que incluyeron hemograma completo, glicemia, colesterol total y eritrosedimentación globular, todos dentro de límites normales.

VDRL y HIV no reactivos.

Se realiza biopsia de piel de las lesiones (Fig. 4).



**Fig. 4** - Imagen histológica de las lesiones.